

Odlarbrev v. 28

- Bladmögel
- Alternaria
- Insekter - kolla fälten för löss!
- Bladskafsinlämning

Bladmögelaktuellt

Infektionstrycket har ökat sedan förra veckan (se tabell nedan). Väderprognosen för kommande vecka pekar på "bladmögelväder" – regnskurar och temperaturer strax över 20 °C.

Veckans rekommendation:

► **1,9 I Revus Pro.**

Revus Pro innehåller de aktiva substanserna **mandipropamid** (Revus) & **propamokarb** (tex Sporax eller Rapport)

Nästa vecka (29) är **Vendetta** planerat (azoxistrobin + Fluazinam)

SKIMMELSTYRING	Infektionstryck v. 28		
Väderstation	07-jul		
Boarp GRID	Lågt	Mosslunda	Lågt
Borgeby	Medel	Mörbylånga /Resmo GRID	Medel
Bräkne-Hoby GRID	Lågt	Nymö-Fjälkinge	Medel
Glemmingebro GRID	Lågt	Näsum/Vånga GRID	Medel
Hellegården	Medel	Oderup GRID	Medel
Hviderup	Medel	Ramdala GRID	Medel
Hässleholm GRID	Medel	Skarhult GRID	Medel
Höllviken GRID	Lågt	Skivarp GRID	Medel
Hönedal GRID	Lågt	Svedala GRID	Lågt
Hörte GRID	Medel	Teckomatorp GRID	Lågt
Kalmar /Halltorp GRID	Lågt	Tollarp GRID	Lågt
Karlshamn GRID	Lågt	Tomelilla GRID	Medel
Kastlösa	Medel	Torekov 1	Medel
Klippan GRID	Medel	Torslunda	Medel
Knislinge GRID	Medel	Trolle Ljungby GRID	Lågt
Laholm GRID	Medel	Vassmolösa	Medel
Lilla Böslid GRID	Medel	Vellinge	Medel
Lister GRID	Lågt	Vittskövle	Medel
Lund/Silvåkra GRID	Lågt	Vä GRID	Medel
Löddeköpinge GRID	Lågt	Åhus GRID	Lågt
Löberöd GRID	Medel	Önnestad GRID	Lågt
Mellby	Medel		
Minimalt			
Lågt			
Medel			
Högt			

Alternaria (torrfläcksjuka)

I fält med hög risk startades behandlingarna förra veckan. I övriga fält är det nu dags att planera årets behandlingar. Se tabell nedan för vägledning. Räkna med att en behandling håller 14 dagar.

Kännetecken

Angrepp av *Alternaria solani* ger mörkbruna fläckar som oftast avgränsas av bladnerverna. Fläckarna brukar innehålla koncentriska ringar som påminner om höjdlinjer på en karta. (Se bild)



Torrfläcksjuka orsakas av *Alternaria solani*, som kan angripa friska blad och snabbt leda till att bladen vissnar. Förväxlingsrisken är stor och andra fläckar kan bero på *A. alternata*, näringsbrist, ozonskador eller fysiologiska orsaker och kräver ingen bekämpning.

Motverka resistensutveckling

Isolat med minskad känslighet mot difenokonazol (Narita/Revus Top) och mefentriflukonazol (Revyona) har påträffats i Europa. För att fördröja resistensutveckling bör dessa preparat inte användas i följd. Växla i stället med Propulse, som har annan verkningsmekanism. Undvik upprepade behandlingar med Revyona eller Narita/Revus Top i samma strategi. Resistens mot strobiluriner (Amistar, Mirador) och boscalid (Signum) har konstaterats i södra Sverige, med sämre effekt som följd. Därför rekommenderas inte dessa preparat.

Alternariapreparat 2025

Preparat	Aktiv substans	Dos	Antal ggr/år	Karens
Narita	difenokonazol 250 g/l	0,4	3 st	14 dagar
Revus top	difenokonazol 250 g/l	0,6	3 st	3 dagar
	mandipropamid 250 g/l			
Propulse	fluopyram 125 g/l	0,45	2 st	21 dagar
	protiokonazol 125 g/l			
Revyona	mefentriflukonazol 75 g/l	1,25	2 st	3 dagar

Alternariastrategi baserat på risk				
		Låg risk	Medelrisk	Hög risk
Maj	v 19	Uppkomst		
	v 20	Åldersresistens mot alternaria i plantan ca 7-8 veckor		
	v 21			
	v 22			
Juni	v 23			
	v 24			
	v 25			
	v 26			
Juli	v 27			0,4 Narita
	v 28		0,45 Propulse	
	v 29			0,45 Propulse
	v 30		1,25 Revyona	
Augusti	v 31			1,25 Revyona
	v 32	0,45 Propulse	0,45 Propulse	
	v 33			0,45 Propulse
	v 34	1,25 Revyona	1,25 Revyona	
September	v 35			1,25 Revyona
	v 36			
	v 37			
	v 38			
	v 39			
Faktorer som påverkar angrepp				
		Låg risk	Medelrisk	Hög risk
		Ej odlat potatis innan	70-80 % sand/grovmo >5 år mellan potatis God växtnäringsstatus	Historiska angrepp Hög andel sand/grovmo >80 % Växtnäringsbrist Torkstress

Mikronäring

Tillför mangan så länge nya blad bildas. Generellt brukar detta betyda julimånad ut.

Insekter

Stritar

Generellt låga förekomster – ingen bekämpning aktuell.

Löss

Kontrollera era fält! Vi hittar löss nu i många fält!

Lössen trivs bäst på undersidan av lågt sittande blad.

Bekämpningströskel: 10 bladlöss per storblad (7-9 småblad)

Bekämpningsrekommendation:

160 g/ha Teppeki (endast effekt på bladlöss)
Max en behandling per år!



Växtnäring

Denna vecka har vi inlämning av bladskäft i Vassmolösa enligt nedan.


Instruktion

A) Plocka fjärde bladet uppifrån, ca 25-30 blad.

B) Avlägsna småbladen så att endast bladskäftet blir kvar.

C) Samla bladskäften (25-30 st) utan småblad och lägg i en plastpåse tillsammans med en lapp med information enligt nedan:

- 1) Odlarnummer
- 2) Namn
- 3) Mailadress
- 4) Fältnamn
- 5) Sort
- 6) Antal dagar efter uppkomst



Viktigt att ovanstående information följer med respektive prov för att vi ska kunna identifiera proven. Analysresultat presenteras senast dagen efter mätningen via mail där man med hjälp av sitt odlarnummer hittar sina mätvärden. Obs. Vi analyserar endast prover från stärkelsepotatis.

10	Juli	10:00	Ingvar Danielsson	Ramdala: Lämna prov hos Jonas F senast 08:30 (flishallen)
----	------	-------	-------------------	--

Hälsningar
Gabriella Malm
gabriella.malm@lyckeby.com
044-28 61 53

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65